MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Pur cation periodique

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN , ARDECHE , DROME , ISERE , LOIRE , RHONE , SAVOIE , HAUTE • SAVOIE

EDITION GRANDES CULTURES

ABONNEMENT ANNUEL:80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A

(7) 862 20 30

Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

16 Mars 1984

Nº de série continue 33

Bulletin nº 4

## COLZA

CHARANCON DE LA TIGE : TRAITEZ DES QUE POSSIBLE

Comme il était prévisible après le temps froid du mois de février, le radoucissement que nous connaissons depuis quelques jours provoque un vol de charançon de la tige localement très important.

En conséquence, un traitement est conseillé dès maintenant en toutes zones excepté la Savoie et la Haute-Savoie

## Produits conseillés et autorisés

Cyperméthrine (CYMBUSH et KAFIL SUPER à 0,25 1 PC/ha) Phosalone (1200 g ma/ha) Parathion (300 g ma/ha) Méthidathion (300 g ma/ha) Lindane (300 g ma/ha) Endosulfan (400 g ma/ha)

Le DECIS autorisé à la vente pour le traitement du charançon des siliques donne également de bons résultats sur le charançon de la tige. Cependant, ce produit n'étant pas homologué pour cet usage, l'utilisateur en prend alors seul la responsabilité sans engagement de la firme commerciale et des services officiels.

Les pyréthrinoïdes (CYMBUSH, KAFIL SUPER, DECIS) ont l'avantage d'agir à basse température et d'avoir une longue rémanence (3 semaines).

Intervenir de préférence par un après-midi de beau temps afin que les charançons soient en pleine activité.

P78